

## UNA CYPERACEA NUEVA DE PATAGONIA

Por MANUEL BARROS

**SCIRPUS SPEGAZZINIANUS** spec. nov.

*Glaucescens, perennis (pulviniformis?). Rhizoma ramosum ascendens, nodosum squamis fuscis dilaceratis mox deciduis obtectum. Caules stricti erecti, graciles 5-9 cm alti, vix 1 mm in diametro, sulcati, laeves, in parte superiore 3-4 cm longa nudi, parte infima vaginis foliorum emarcidis vestiti, medio 4-5 foliati. Folia approximata caulem subaequantia; lamina strictiuscula, linearis 2,5-3 cm longa, 0,8-0,9 mm lata plana, marginibus crassis atque laevibus, abrupte acuminata*




Fig. 1.—a. Aspecto de la planta x1; b. Gluma, vista dorsal x10; c. Espiga x10; d. Pistilo x5; e. Estambre x5.

*apice obtusa; vagina superne hyalino-membranacea et parum ampliata, ore oblique secta. Inflorescentia monostachya, terminalis,*

ebracteata; spica elliptica obtusa, 6-7 mm longa, 4 mm lata; glumae pallide castaneae marginibus pallidioribus, dorso viridibus uninerviis, orbiculato-ovales, apice laeviter emarginatae et brevissime mucronatae, 4 mm longae, 3 mm latae; gluma inferior fertilis, spica brevior, basem amplexens, dorso nerviis 3 prominentibus percursa, mucrone valido obtuso viridi munita. Stamina 2-3 (saepius 3); filamenta filiformia exserta; antherae lineares 2,5-3 mm longae, breviter apiculatae. Ovarium ellipticum 2,5 mm longum; stylus 5 mm longus exsertus; stigmata 2, papillosa, longe exserta. Achenium (immaturum) ellipsoideum album leviter reticulatum.

Gobernación de Santa Cruz, Estancia "Cerro Buenos Aires", lago Argentino, leg. Rutile A. Spegazzini 20 I 1941 N° 565 (BAB 61742).

Esta planta difiere de todas las pequeñas especies de *Scirpus* de las regiones andinas, provistas en su mayoría de estilos trífidos y setas hipoginas; de las especies con estilo bífido se aparta por su inflorescencia monostaquia y ebracteata. Boeckeler describe en *Linn. v. XXXVI* (1869-70) p. 483, una planta hallada en el Cabo de Buena Esperanza, en Tasmania y en la isla de la Reunión, el *Scirpus lenticularis* (Spreng) Kunth, cuyos caracteres coinciden en parte con los de esta nueva especie; pero difieren de ella por sus tallos capilares, el color de las glumas y el número de estambres, que es de 2 según Kunth y Boeckeler.




FIG. 1.—a. Aspecto de la espiga x1; b. Gluma vista lateral x10; c. Espiga x10; d. Espiga x1; e. Estambres x1.

Aspecto obispo: vagina superior hialina-transparente el primum omnino: ore obispo secto. Inflorescencia monostaquia terminalis.