

ESPECIES NUEVAS O CRITICAS DE LA FLORA JUJEÑA. III

POR AIDA PONTIROLI¹

SUMMARY

New or critical species from the flora of Jujuy, Argentina.

Eryngium glossophyllum Wolff from Southern Bolivia, is mentioned as new for the Argentine Flora.

UMBELLIFERAE

Al preparar la revisión del género *Eryngium* en la Argentina, he hallado una especie que crece en el este de Jujuy, y que al parecer es nueva para el país. Se trata de *Eryngium glossophyllum* Wolff, que describo a continuación, y que hasta el presente se había citado solamente para el extremo sur de Bolivia.


Eryngium glossophyllum Wolff

Wolff, en Engler's Bot. Jahrb. 40: 30, 1908.

Hierba perenne, glabra, de hasta 10 cm de altura, con raíces fibrosas fasciculadas. Tallos subnulos. Hojas arrosetadas, membranáceas, lanceoladas, de 5-10 cm de longitud y 1-2 cm de ancho, mucronadas en el ápice, y atenuadas inferiormente en un pecíolo de base cortamente envainadora, serrado-espínulosas o crenado-espínulosas en el margen, con venación paralela en el área central, divergente y anastomosada hacia el margen.

Inflorescencia con un pedúnculo terminal y a veces 1-2 ramas laterales, cada una con dos brácteas lineales espínulosas de 12-15 mm de longitud. Capítulos semiglobosos, algo deprimidos, 40-50 flores, de 12-18 mm de diámetro y 8-12 mm de altura. Brácteas involucrales 8-9, connatas en la base, ovado-lanceoladas, acuminadas, enteras o dentadas, de 8-15 mm de longitud y 3-5 mm de ancho, mucho más cortas que los capítulos. Brácteas florales mucronadas, de 4-5 mm de largo. Sépalos ovados, enteros,

¹ División Plantas Vasculares. Museo de La Plata.



Eryngium glossophyllum Wolff. A, Aspecto general; B, Capítulo; C, Flor; D, Pétalo; E, Estilopodio y estilos; F, Estambre; G, Bráctea involucral; H, Bráctea floral

de 1,5-2 mm de longitud. Pétalos oblongos, de 2-2,5 mm, con lóbulo inflexo entero. Estilos de 3 mm de longitud, superando a los sépalos y pétalos. Ovario de 3-4 mm de largo, densamente cubierto con escamas laterales y dorsales lanceoladas, libres. Frutos no vistos.

Andes del sur de Bolivia y noroeste de la Argentina. Vegeta en laderas montañosas, desde los 2800 a los 3500 m de altura sobre el mar.

MATERIAL ESTUDIADO:

ARGENTINA. Prov. Jujuy. Dep. Tumbaya: Volcán, Abra Morada, leg. A. L. Cabrera con M. A. Torres, N. Tur y R. Kiesling 18303 (LP). Volcán, filo del Vallecito, subida al cerro Horqueta, leg. A. L. Cabrera et O. T. Solbrig 16984 (LP). Abra Grande de Volcán, leg. Sleumer 3554 (SI). Dep. Valle Grande: Serranía de Calilegua, cerro Hermoso, leg. H. A. Fabris con J. Crisci y B. Petriella 5829 (LP). Santa Ana, praderas a 3100 m.s.m., leg. A. Burkart y N. Troncoso 11651 (SI).

Esta especie, que se cita por primera vez para la Argentina, está ubicada en la Sección *Stellata* Wolff, que no tiene ningún otro representante en América del Sur. Las siete especies restantes de la Sección crecen en América del Norte y América Central.

Por su pequeño porte, las hojas todas basales y los tallos subnulos, no se asemeja a las otras especies argentinas, incluidas en seis Secciones distintas.