

Una especie nueva del género *Senecio* de Patagonia

por ANGEL LULIO CABRERA

SENECIO SKOTTSBERGII nov. sp.

Suffrutex humilis, ramosus, 10-15 cm. altus, caulibus adscendentibus, dense argenteo-tomentosis densissime foliosis. Folia alterna, oblonga, apice obtusa, basi leviter attenuata, integerrima vel raro ad apicem dentata, utrinque dense argenteo-tomentosa, 12-20 mm. longa, 2.5-3.5 mm. lata. Capitula discoidea, apice ramulorum solitaria, breviter pedunculata. Involucrum late campanulatum, 8-10 mm. altum, 10-13 mm. crassum, bracteolis calyculi linearibus brevibus, tomentosis, bracteis involucri 16-20, lineari-lanceolatis, apice attenuatis penicillatisque, dorso tomentosis vel glabrescentibus. Flores multi, lutei, isomorphi, hermaphroditi, corolla tubulosa circa 7 mm. longa, apice pentadentata. Achaenia cylindracea, costata, glabra vel leviter pubescentia. Pappus albus. 7 mm. longus.

Sufrutice bajo, ramoso, de 10-15 cm. de altura. Tallos ascendentes, densamente argenteo-tomentosos, muy apretadamente hojosos hasta cerca del ápice. Hojas alternas, amontonadas, oblongas, obtusas en el ápice y apenas atenuadas en la base, generalmente enteras, pero a veces con uno o dos dientes gruesos a cada lado cerca del ápice, densamente argenteo-tomentosas en ambas caras, de 12-20 mm. de longitud, por 2,5-3,5 mm. de anchura. Capítulos discoideos, solitarios en el extremo de las ramitas, cortamente pedunculados: pedúnculos lanosos o glabrescentes, de 5-15 mm. de largo. Involucro anchamente acampanado, caliculado, de 8-10 mm. de altura, por 10-13 mm. de diámetro, de la misma longitud o poco más corto que las flores; bracteolas del cálculo lineales, cortas, tomentosas; brácteas involucrales 16-20, lineal-lanceoladas, atenuadas y peniciladas en el ápice, tomentosas o glabrescentes en el dorso. Flores numerosas, amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola tubulosa de unos 7 mm., pentadentada en el ápice: dientes obtusos, de 1 mm. de largo, con nervadura central. Aquenios cilíndricos, costados, glabros o muy cortamente papilosos. Pappus blanco, de 7 mm. de largo.

Distribución geográfica. — Especie endémica de las montañas de Patagonia.

Material estudiado:

ARGENTINA. Chubut: Lago Blanco, leg. J. Kosłowsky, 1903-04 (Typus: LP.).

CHILE. Magallanes: Cerro Prat, Ultima Esperanza, leg. G. Fester, 10, I-1931 (SI.).

Obs. Especie afín a *S. allocephyllus* O. Hoffm., pero con pubescencia diferente y hojas casi siempre enteras. Dedico esta especie al botánico sueco Carlos Skottsberg, uno de los mejores conocedores de la Flora patagónica.




Fig. 1. — A, planta; B, hoja; C, capitulo; D, flor; E, detalle de la corola; F, antera; G, estilo; H, aquenio.