

Villa Montes, Bajada del Chimeo, 1050 m, 25-V-1971, Krapovickas *et al.* 19232 (CTES, LPB, LIL, MO); 28 Km W de Villa Montes, 560 m, 26-V-1971, Krapovickas *et al.* 19575 (CTES, LPB, MO); Puerto Margarita, río Pilcomayo, 2-V-1983, Krapovickas y Schinini 39096 (CTES). Dep. Santa Cruz, prov. Cordillera, 7 km W de Boyuibe, 14-IV-1977, Krapovickas y Schinini 31308 (CTES, LPB, LIL, SI, MBM, MO, G, K).

EL GENERO *PELTAEA* (MALVACEAE) EN ARGENTINA

Por ANTONIO KRAPOVICKAS y CARMEN L. CRISTOBAL¹

El objeto de esta nota es documentar la presencia en nuestro país de *Peltaea* (Presl) Standley, género citado recientemente: Krapovickas, A. *Malvaceae* Juss., en A. T. Hunziker (ed.). Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 23: 184, 1984.

Peltaea es un género americano constituido por 16 especies, que se extiende desde Cuba y el S de Centroamérica hasta el N de Rio Grande do Sul en Brasil. Dentro de ésta área se lo encuentra en sabanas, campos y especialmente en el "cerrado" (Krapovickas & Cristóbal, *Kurtziana* 2: 135-216, 1965).

El material fue encontrado en el NE de la provincia de Misiones, a 5-7 km al sud de Bernardo de Irigoyen, en una mancha de campo cerca del cementerio, y corresponde a *P. edouardii* (Hochr.) Krapov. & Cristób. (*L.c.* 191, figs. 5H y 15).

Era previsto este hallazgo dado que *P. edouardii* ha sido coleccionada en el E de Bolivia, en Paraguay y en Brasil, desde Goiás hasta el N de Rio Grande do Sul.

Material estudiado: Argentina. Prov. Misiones, Dpto. General Manuel Belgrano, ruta 14, Bernardo de Irigoyen, subarbusto 30 cm alt., flor rosada 5.I.1970, V. Maruñak 92 (CTES, LP, MBM, P, C, UC, WIS, NY, herb. Fryxell).

¹ IBONE, C. Correo 209 (3400) Corrientes.